



アベマキ [栲]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 ブナ科 (APGⅢ)

特記 生長：速い

コナラやクヌギとともに雑木林の代表樹種。薪炭林やシイタケ栽培のほだ木として利用されてきた。葉と実（どんぐり）がクヌギとよく似ているが、クヌギと比べ葉は幅が広く裏が白っぽい。コナラの実（どんぐり）は当年の秋に、クヌギとアベマキの実は翌年の秋に成熟する。



葉



花



黄葉



実

Memo

樹皮が厚くコルク層がよく発達しているため、以前、コルクガシの代用としてコルクが採られた。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期				■ (花は目立たない)								
果	実									■ (翌年の秋に成熟)			
黄	葉											■	
施	肥	(早期に大木になるので施肥は控える)											
剪	定	■					■						■

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱


観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○				○	○	

ポイント 生長が速いため施肥は控える。樹高を止める場合、幹が太くなってからの強剪定は美観を損なう。

剪 定 生長が速いので、自然の樹形を損なわないよう枝抜き剪定をする。樹高を抑えるには芯止をする。落葉樹だが、翌年まで枯れ葉が枝に残ることが多い。

病虫害 テッポウムシ（カミキリムシの幼虫）が幹に穴をあけることがある。幹下に木屑を見つけ次第駆除する。風通しが悪いと、うどんこ病が発生しやすい。

呼べる鳥  [カケス](#)

呼べる蝶  [アカシジミ](#)・ゴマダラチョウ
ミズイロオナガシジミ
ウラナミアカシジミ・オオミドリシジミ
ウラミスジシジミ・エゾミドリシジミ
ウラジロミドリシジミ・ムモンアカシジミ
ミクロシジミ・ミヤマセセリ