



アーモンド

落葉／中高木／木本植物／外来種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

3～4月、桃の花を一回り大きくしたような桃色の花を咲かせる。日本で消費されるアーモンドの多くは、カリフォルニア産。開花から収穫まで雨が少なく乾燥している。梅雨や高温多湿などがある日本の気候は、実を収穫するには適していない。花の観賞目的での配植が無難。



葉



花



実



紅色の品種

Memo

アーモンドはモモと近縁。違いはモモは果肉を食べるがアーモンドは種の中の仁（じん）を食べる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期				■									
果 実								■					
紅 葉													
施 肥		■				■				■			■
剪 定		■				■		★★					■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日 当 り	陽	◎	○	陰
土 壌	乾	○	○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強		○	弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○				○

ポイント

日がよく当たる場所を好む。寒さに弱く、開花時期がモモより早いため、寒い地方では低温障害を受けやすいので注意する。自家不和合性が強いので、異なる品種を2株を植えないと実が付きにくい。

剪定

剪定は、枝抜き剪定により枝透かしを行う。枝が見え隠れする程度がよい。7～8月には翌年の花芽ができるため、これ以降は整姿程度の剪定にする。切り口を消毒し、傷口癒合剤を塗布するとよい。

病虫害

病害は縮葉病(しゅくようびょう)、虫害はカイガラムシ、アブラムシ、コスカシバなど。コスカシバに加害されると、幹枝からヤニを出し樹勢が衰退する。