



# アオキ (園芸品種)

常緑 / 低木 / 木本植物 / 在来種・園芸品種



**科名** アオキ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通、雌雄異株

多くの園芸品種があるが代表的な品種に、黄色い外斑（覆輪）の「サルフレア・マルギナータ」、中斑の「ピクチュラータ」、散り斑が入る「スターダスト」など雌木だけの品種がある。アオキの雄株を植えると結実する。他に「シロミアオキ」や「ホソバアオキ」などがある。



スターダスト



ピクチュラータ



サルフレア・マルギナータ



雌花

## Memo

斑入りの園芸品種は原種に比べ生長がやや遅く、強い日差しを受けると斑入り部が葉焼けしやすい。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期			■ (花は目立たない)									
🍒	果実	■										■	
🍁	紅葉												
🌱	施肥	(痩せ地でない限り施肥は控える)											
✂️	剪定	■								★★			■
★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）													

好みの環境			
日当たり	陽	○	耐陰
土壌	乾	○	○ 湿
寒さ	強	○	弱
暑さ	強	○	弱
潮風	強	○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
				○			○

## ポイント

強い日差しと乾燥が苦手。施肥すると徒長しやすいため肥料は控えるとよい。大きな木の下や日陰地でもよく生育する。鬱蒼（うっそう）としてきたら適宜剪定するとよい。

## 剪定

強剪定を嫌うため、混み合った部分を枝抜きする。表面がコルク状になった太い枝や古い枝を切除し、新しい枝と新旧入れ替えるとみずみずしく維持できる。

## 病虫害

炭そ病(カビの一種)にかかると葉に黒斑が広がる。高温、乾燥、台風などで葉が傷つくと発症しやすい。虫害はアオバハゴロモが発生することがある。幼虫が白い綿状の分泌物で枝を覆う。