



# ブラックベリー

落葉／つる類／木本植物／外来種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：速い  
草本扱い（保証の観点より）

5～6月頃、花序に白色～淡桃色の花をつける。6～8月になると、果実は順次赤から黒色になり成熟を増してくる。ビタミンCやアントシアニンが豊富で、生食のほかジュースやジャムに利用される。繁殖力旺盛な刺のあるつる植物。管理できる条件下で育てないと持て余す。



## Memo

実を付けるのは前の年に勢いよく伸びた枝なので、古い枝は整理し新しい枝を誘引するとよい。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	花期					■							
果	果実							■					
紅	紅葉												
施	施肥	■					■						
剪	剪定	■						■	★★				■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日当たり	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強		○	弱
暑さ	強	○		弱
潮風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○		○	○	○

### ポイント

日当たりと水はけの良い場所を好む。収穫目的の場合、堆肥や腐葉土を敷き込む。多肥するとつるばかりが繁茂しやすい。観賞目的であれば、つるを誘導し適宜剪定する。熟した果実は早めに摘み取る。

### 剪定

剪定は、年2回。実を収穫した枝を付け根から切る夏剪定と落葉期につるを整える冬剪定が必要。新梢を伸ばし、翌年この枝から伸びる短枝に花をつける。2年目の枝に実を付けるため新旧更新する。

### 病虫害

モモチョッキリゾウムシやコガネムシの食害を受けることがある。茎に穴をあけるコウモリガの幼虫は、地表の草や枯葉から移動してくるので、根元周辺を除草し、幹下に木屑を見つけ次第駆除する。