



# エゾノウワミズザクラ

[ 蝦夷の上溝桜 ]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

初夏、葉の展開後に芳香ある白い花を咲かせる。ウワミズザクラとの違いは①花は2倍ほどでブラシ状に密生しない②蜜腺が葉柄上にある③果実は黒っぽいなど。ユーラシア大陸の冷涼な地域、国内では青森以北に自生する。果実は野鳥の好餌になる。英名はBird Cherry。



葉



花



ひこばえ



園芸品種「コロラータ」

## Memo

主な繁殖は、伏条更新（ふしじょうこうしん）。積雪により下枝が地面に接するとそこから発根する。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期						■							
果 実								■					
紅葉・黄葉										■			
施 肥		■ (痩せ地でなければ不要)											
剪 定		■ (極力避ける)											

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	○
寒 さ	強	◎		弱
暑 さ	強		○	弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○		○	○	○

### ポイント

地面に接した枝や地下茎からよく発芽する。積雪地特有の繁殖方法。湿り気のある肥沃土壌を好む。寒さに強く寒冷地にお薦めの花木。暖地でも強い日差しや西日を防げば配植できるが衰退しやすい。

### 剪 定

剪定は極力避け、自然樹形を生かしたい。大枝の剪定を嫌うため、枝は細い時期に枝抜き剪定し、切り口を消毒し傷口癒合剤を塗布するとよい。根回りの不要なひこばえは早めに切除する。

### 病虫害

ソメイヨシノなど、花見をする一般のサクラに比べ、病虫害は少ない。

呼べる蝶 コツバメ・メスアカミドリシジミ  
エゾシロチョウ・リンゴシジミ