ハマヒサカキ ［浜姫榊］

5本の樹

常緑／低木／木本植物／在来種

科　名　サカキ科（APGⅢ）

特　記　生長：やや遅い、雌雄異株

ハマヒサカキの‘ハマ’は‘浜’。関東南部以西の太平洋側の海岸沿いに自生し、潮風、強風に強い。葉の先が丸いので何か優しい感じがする。秋に咲くことがヒサカキと異なるが、枝葉を密に分岐するなど特性は共通する。雌雄異株。秋、雌株の枝には花と実が同時につく。

Memo

ポリネーター(花粉媒介者)はハエやアブのため、花の香りは独特。都市ガスの匂いに例えられる。

お手入れカレンダー

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花　期											■	■
果　実											■	■
紅　葉												
施　肥	■	■	■	（痩せ地でなければ不要）								
剪　定	■	■	■			■	■	■			■	■

好みの環境					
日当り	陽	○	○	○	陰
土　壌	乾	○	○	○	湿
寒　さ	強		○		弱
暑　さ	強	◎			弱
潮　風	強	◎			弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○		○			○	

ポイント　沿海部に生育する植物は強い日差しや西日に耐える。そのため、ビルや道路からの輻射熱が強い都市部でよく配植される。丈夫で管理しやすいが、水切れしないよう注意する。

剪　定　萌芽力があり強剪定に耐え葉が密生するので、生垣や刈り込みに利用できる。刈り込みは新芽の展開前にするとよい。生垣は５月、７月、１０月の年３回剪定すると維持しやすい。

病虫害　風通しが悪いとカイガラムシが発生し、その排泄物に「すす病(カビの一種)」が誘発される。原因はカイガラムシのため一緒に駆除する。

呼べる鳥　シロハラ・メジロ・ルリビタキ
キビタキ・ウグイス・ジョウビタキ
ツグミ・イソヒヨドリ

呼べる蝶　サツマシジミ

SEKISUI HOUSE

COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.