




ハナカイドウ [海棠]

落葉 / 低木 / 木本植物 / 外来種・園芸品種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや遅い

枝の先々に淡桃色の花が5輪ほど枝垂れて咲く。ミカイドウ、ノカイドウなどあるが、庭木として親しまれているのは、一際美しいハナカイドウ。花径3cm程の大きな花をつける中国原産のリンゴの仲間。中国では美人の形容に使われるほど。低木の庭木として配植しやすい。



緑葉



花



全景



花

Memo

唐の玄宗皇帝が、酔って眠そうな楊貴妃の顔を見て「海棠の眠り未だ足らず」と言った逸話がある。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期				■								
🍒	果実 (結実は少ない)									■			
🍁	紅葉												
🌱	施肥	■							■				
✂️	剪定	■						★★					■
★：花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)													

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強	○		弱
暑さ	強		○	弱
潮風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					

ポイント

2月と8月に油粕や骨粉などを施すと、花をたくさん咲かせる。日がよく当たる場所で、枝が見え隠れする程度に剪定すると花付も良く、病害虫の発生も抑えられる。

剪定

生長は比較的遅いため、軽めの剪定にて樹形を維持しやすい。短枝に花をつけるので、長枝は4～5芽残して10～20cmほどに切り詰め、弱々しい枝やひこばえは切除するとよい。

病虫害

バラ科リンゴ属は病虫害が多く、カイガラムシ、アブラムシのほか樹幹に穴をあけるテッポウムシ (カミキリムシの幼虫) の加害、病害ではうどんこ病、赤星病 (さび病の一種) が発生することがある。