



# ヒラドツツジ [平戸躑躅]

常緑 / 低木 / 木本植物 / 園芸品種



**科名** ツツジ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通

ヒラドツツジは、長崎県平戸市で栽培されてきた大型ツツジの総称名。紅紫の花をつけるオオムラサキや薄紅色のアケボノ、新芽がべとつくモチツツジなど品種が豊富。丈夫なことから共同住宅などで使いやすい。別系統のリュウキュウツツジも似ているため同等に扱われる。



緑葉



オオムラサキ



白花



アケボノ

## Memo

ヒラドツツジは、赤～紫系、ピンク系、白系の花があるので、'配色'も考慮して配植するとよい。

| お手入れカレンダー                     | 月 | 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6                | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|------------------|---|---|---|----|----|----|
| 🌸 花期                          |   |   |   | ■                          |   |   |                  |   |   |   |    |    |    |
| 🍒 果実                          |   |   |   | (花後にできる蒴果(さくか)は花殻とともに除去する) |   |   |                  |   |   |   |    |    |    |
| 🍂 紅葉                          |   |   |   |                            |   |   |                  |   |   |   |    |    |    |
| 🌱 施肥                          |   | ■ |   |                            |   |   |                  |   |   |   |    |    |    |
| ✂️ 剪定                         |   |   |   |                            |   |   | ■ (花後早めに)<br>★★★ |   |   |   |    |    |    |
| ★：花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる) |   |   |   |                            |   |   |                  |   |   |   |    |    |    |

| 好みの環境 |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 日当たり  | 陽 | ○ | ○ | ○ | 陰 |
| 土壌    | 乾 |   | ○ |   | 湿 |
| 寒さ    | 強 | ○ |   |   | 弱 |
| 暑さ    | 強 | ○ |   |   | 弱 |
| 潮風    | 強 |   | ○ |   | 弱 |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
|        | ○ | ○ |   |    |    |   |   |

## ポイント

強健なため、公園や共同住宅、マンションでよく利用される。リュウキュウツツジ系に比べオオムラサキ系は耐寒性が低い。どちらも浅根性（根の張り方が浅い）のため根周りの乾燥に注意。

## 剪定

常緑性のツツジ類は花の終わった直後に刈り込む。新梢の先に早くも翌年の花芽をつけるので、遅れると花が少なくなる。強剪定は花後、以後は徒長枝の切り戻し程度が理想。

## 病虫害

夏の乾燥時にグンバイムシやハダニが発生する。駆除し充分灌水する。モチツツジには自衛策がある。新芽や花にべと付く腺毛があり、アブラムシやアリは寄り付かない。