



カワヅザクラ [河津桜]

落葉／中高木／木本植物／園芸品種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

冬寒の2月頃にピンク色の花を咲かせる早咲きの桜。伊豆の河津町で発見されたのが名の由来で、ご当地では毎年「河津桜まつり」が開催されている。紅色の花をつけるカンヒザクラと、白色の花をつけるオオシマザクラとの自然交配種といわれるが、そのルーツには諸説ある。



Memo

花期が長いのが特徴で、葉の展開前の2月中旬頃に満開となり、その後1カ月ほど咲き続ける。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期		■											
果 実						■							
紅葉・黄葉											■		
施 肥		■							■				
剪 定		■ (極力避ける)						★★					■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強		○	弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○		○		

ポイント

大きめのピンクの花と、1ヶ月以上も楽しめる特性を生かしてよく観賞できる位置がよい。樹形を整えれば庭園にも配植できる。日当たりと排水がよく、踏圧を受けない場所に高植えが適している。

剪 定

剪定は注意が必要である。特に太い枝の切除は切り口から菌に感染しやすい。将来、邪魔になりそうな枝は細い時期に剪定し、切り口を消毒し傷口癒合剤を塗布するとよい。

病虫害

庭木の中では病虫害が多いため、定期的にチェックし対処する必要がある。葉を食害するシャチホコやイラガ類、吸汁するカイガラムシなどの被害を受けることがある。