



キハダ

[黄檗・黄膚・黄柏]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 ミカン科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い、雌雄異株

樹冠が広がるので緑陰樹に利用される。樹名は樹皮を剥くと黄色の内皮があることに由来。生育が盛んな梅雨期に内皮が採取され、乾燥後、健胃、抗菌作用がある黄柏（おうばく）が作られる。今日でも重要な医薬品。北海道から九州まで全国に分布する雌雄異株の落葉高木。



Memo

冬芽は、葉柄のつけ根の内部にあり、落葉すると現れる。葉柄内芽（ようへいないが）と呼ばれる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期					■ (花は目立たない)							
果	実									■			
黄	葉										■		
施	肥	■ (痩せ地でなければ不要)											
剪	定	■											■


好みの環境			
日当り	陽	○	陰
土壌	乾	○	湿
寒さ	強	○	弱
暑さ	強	○	弱
潮風	強	○	弱


観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○				○		

ポイント 山地の溪流沿いや沢沿いなど適度に湿った場所に生育する。根は浅根性（根の張り方が浅い）なので乾燥を嫌う。大きな羽状複葉をつけるので、枝を透かして涼しげに仕上げるとよい。

剪定 繁茂し鬱蒼（うっそう）としないよう枝抜き剪定がおすすめ。比較的生長が速く、大きく育つので計画に合わせ芯を止める。緑陰など目的に合わせ剪定するとよい。

病虫害 病虫害は少ないが、カイガラムシが発生することがある。カラスアゲハやミヤマカラスアゲハの幼虫の食樹である。

呼べる鳥  [イカル](#)・[アオゲラ](#)・[ツグミ](#)

呼べる蝶  [キアゲハ](#)・[クロアゲハ](#)・[ルリシジミ](#)
[カラスアゲハ](#)・[ミヤマカラスアゲハ](#)
[モンキアゲハ](#)・[トラフシジミ](#)
[オナガアゲハ](#)・[スギタニルリシジミ](#)