



# キタコブシ [北辛夷]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** モクレン科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

コブシに比べ葉、花ともに大きく、花は淡い桃色を帯び芳香がある。幹を直立するように伸ばし、ほっそりとした樹形になることが多い。本州のコブシが3月頃から咲くのに対し、札幌周辺のコブシは4～5月頃に咲く。本州中部以北の日本海側に自生するコブシの北方種。



葉



花



黄葉



実

## Memo

コブシに限らず寒い北海道に育つ植物は、本州の近縁種に比べ葉、花ともに大きくなることが多い。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実									■				
黄 葉												■	
施 肥		■											
剪 定		■				■ (花後早めに) ★★							

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日 当 り	陽	○	○	陰
土 壌	乾		○	○ 湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○	○				○	○

## ポイント

乾燥に弱いため植付直後は気を付ける。生長が速いため大きく育つスペースが必要。枝抜き剪定と時期がポイント。モクレン科の樹は移植を嫌うので植付場所は慎重に決めたい。

## 剪 定

剪定適期は2月頃と花後の1ヶ月。2月は花芽が良くわかり、残す枝の選別が容易。また、6月中旬には翌年の花芽を形成するため、それ以降では翌年の花芽を切ることになる。

## 病虫害

葉が「コブシハバチ」の食害を受けることがある。

## 呼べる鳥



アオゲラ・カケス・ツグミ・スズメ  
コムクドリ

## 呼べる蝶



キタテハ