



# キウイフルーツ (キウイ)

落葉／つる類／木本植物／外来種・栽培品種



**科名** マタタビ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：速い、雌雄異株

大きな白い花と、鈴なりになる果実に人気がある。果実は収穫後「追熟」する必要がある。原産地の中国からニュージーランドへ渡り品種改良された。果実の形が国鳥のキウイに似るためキウイ、標準和名はキウイフルーツ。サルナシやマタタビと同じマタタビ科のつる植物。



葉



雄花 (雄株)



雌花 (雌株)



実

## Memo

「追熟 (ついじゅく)」とは、果実を収穫後、一定期間置き完熟させる処理のこと。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期				■								
🍌	果実										■		
🍁	紅葉												
🌱	施肥	■											
✂️	剪定	■ (適宜剪定する)											

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強		○	弱
暑さ	強	○		弱
潮風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
							○

**ポイント** 寒さに強く東北南部以南で生育できる。雌雄異株なので、雌株と受粉用の雄株を植える。雄株は小さめにまとめ雌株を大きく育てる。収穫目的の場合は人工受粉、摘蕾、摘果をすると果実が充実する。

**剪定** 生長力旺盛でよく繁茂する。広い面積の棚が必要。繁茂すると重量も増えるので、鋼管パイプなど丈夫な下地がお薦め。長いつるを幾重にも伸ばすので剪定が欠かせない。管理できないと持て余す。

**病虫害** 枝、葉、花などに褐色の斑点が生じる細菌性の「かいよう病」にかかることがある。傷口から感染するので注意する。また、剪定で使用したハサミやノコギリを消毒し、感染を防ぐとよい。