



クヌギ [椽・櫟・栲]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 ブナ科 (APGⅢ)

特記 生長：速い

コナラとともに里山を構成する代表樹種。薪炭林やシイタケ栽培のほだ木として利用されてきた。子供たちには'どんぐり'とともにカブトムシやクワガタムシが樹液に集まる樹として人気がある。コナラの実(どんぐり)は、当年の秋に、クヌギの実は翌年の秋に成熟する。



Memo

落葉樹ではあるが、枯れ葉は枝に付いたまま冬を越し、翌年の新芽が出るまで残ることが多い。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期				■ (花は目立たない)								
果	実					■ (翌年の秋に成熟)							
黄	葉										■		
施	肥	■ (早期に大木になるので施肥は控える)											
剪	定	■					■						■


好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱


観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○				○	○	

ポイント 生長が速いため施肥は控える。樹高を止める場合、幹が太くなってからの強剪定は美観を損なう。

剪 定 生長が速いので、自然の樹形を損なわないよう枝抜き剪定をする。樹高を抑えるには芯止めをする。

病虫害 テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)が幹に穴をあけることがある。幹下に木屑を見つけ次第駆除する。風通しが悪いと、うどんこ病が発生しやすい。

呼べる鳥  [カケス](#)・マガモ・オシドリ・[キジバト](#)
コガモ・[オナガ](#)

呼べる蝶  [アカシジミ](#)・ムラサキシジミ・ルリシジミ
ゴマダラチョウ・ミズイロオナガシジミ
ミスジチョウ・ミヤマセセリ
ウラミスジシジミ・ウラナミアカシジミ
オオミドリシジミ