



クルメツツジ [久留米躑躅] / キリシマツツジ [霧島躑躅]

常緑 / 低木 / 木本植物 / 園芸品種



科名 ツツジ科 (APGⅢ)

特記 生長：普通

小型の花は、紫、紅、桃、白など品種が多く、一斉に開花すると枝先を埋め尽くす。キリシマツツジの系統で、江戸期から大正期に多くの品種が作出された。久留米で改良された系統がクルメツツジと呼ばれる。サツキに似ているが、葉はやや大きめ、花は1ヶ月ほど早く咲く。



緑葉



花



花



花

Memo

キリシマツツジには、江戸で改良された江戸キリシマ系と久留米で改良されたクルメツツジがある。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 花 期 | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 果 実 | | (花後にできる蒴果(さくか)は花殻とともに除去する) | | | | | | | | | | | |
| 紅 葉 | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 施 肥 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | |
| 剪 定 | | | | | | ■ | | | | | | | |
| ★：花芽分化の時期(分化後に剪定すると花付が少なくなる) | | | | | | | | | | | | | |

| 好みの環境 | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 日当り | 陽 | ○ | ○ | 陰 |
| 土 壤 | 乾 | | ○ | 湿 |
| 寒 さ | 強 | ○ | | 弱 |
| 暑 さ | 強 | ○ | | 弱 |
| 潮 風 | 強 | | ○ | 弱 |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
| | | ○ | | | | | |

ポイント

移植は容易だが、浅根性(根の張り方が浅い)のため表土が乾燥したり、過湿になると枯れやすい。梅雨の排水不良と夏期の水切れに注意。鹿沼土のような保水と通気性ある酸性土壌を好む。

剪 定

初夏には翌年の花芽が形成されるので剪定、刈り込みは、花が終わったら早目に実施する。遅れると翌年の花付が悪くなる。花後に強剪定して、以後は徒長枝の切り戻し程度が理想。

病虫害

丈夫だが、夏の高温時に乾燥すると、グンバイムシやハダニが発生し、葉が白っぽく変色しやすい。駆除し充分灌水する。