



オオヤマザクラ [大山桜]

(エゾヤマザクラ/ベニヤマザクラ)

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

赤味を帯びる若葉の展開と同時、もしくはやや早く咲き、秋の紅葉も美しい。ヤマザクラに比べ、葉、花とも一回り大きく花色が濃い。そのため、ベニヤマザクラとも呼ばれる。初夏に黒紫に熟す実は野鳥の好餌。雪や寒さに強く、北海道、東北北部に自生する代表的なサクラ。



緑葉



花



紅葉



実

Memo

桜前線はソメイヨシノの開花予想日を結ぶが、北海道はエゾヤマザクラ、沖縄はカンヒザクラになる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期				■								
🍒	果実					■							
🍂	紅葉・黄葉										■		
🌱	施肥	■								■			
✂️	剪定	■ (極力避ける)							★★★				■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）


好みの環境			
日当たり	陽	○	陰
土壌	乾	○	湿
寒さ	強	◎	弱
暑さ	強	○	弱
潮風	強	○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○		○	○	

ポイント 日当たりと排水の良い土壌を好む。冷温帯に自生することから寒さに強い。配植には広さも必要。大枝の剪定を嫌い切断部から菌に感染し衰退しやすいので充分注意する。

剪定 剪定は注意が必要である。特に太い枝の切除は切り口から菌に感染しやすい。将来、邪魔になりそうな枝は細い時期に剪定し、切り口を消毒し傷口癒合剤を塗布するとよい。

病虫害 庭木の中では病虫害が多いため、定期的にチェックし対処する必要がある。葉を食害するシャチホコやイラガ類、吸汁するカイガラムシなどの被害を受けることがある。

呼べる鳥  アオバト・カケス・イカル・メジロ
オナガ・コムクドリ

呼べる蝶  メスアカミドリシジミ・リンゴシジミ