

落葉／つる類／木本植物／外来種・園芸品種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通  
草本扱い（保証の観点より）

無農薬で収穫できる家庭果樹。夏と秋の年2回収穫できる「二季なり性」や刺のない品種もある。果実は生食のほか、ジャムやジュースなどに利用される。ブラックベリーに比べ寒さに強いが、暑さに弱い。夏期に冷涼な気候を好むので、関東地方以北での栽培に適している。



葉



葉とつる



花



実

## Memo

茎は2年で入れ替わる。1年目には葉だけを付け、2年目に花と果実をつけると枯れてしまう。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期					■	■	■		■	■		
🍓	果実						■	■			■	■	
🍃	紅葉												
🌱	施肥	■	■	■		■	■						
✂️	剪定	■	■	■				■	★★				■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日当たり	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強	○		弱
暑さ	強		○	弱
潮風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
					○	○	○

## ポイント

日当たりと水はけの良い場所を好む。収穫目的の場合は堆肥や腐葉土を敷き込む。多肥するとつるばかりが繁茂しやすい。果実が花托から離れやすくなったら収穫。日持ちしないため地産地消の果実。

## 剪定

剪定は、年2回。実を収穫した枝を付け根から切る夏剪定と落葉期につるを整える冬剪定が必要。新梢を伸ばし、翌年この枝から伸びる短枝に花をつける。枝は2年で枯れるため、新旧更新する。

## 病虫害

モモチョッキリゾウムシやコガネムシの食害を受けることがある。茎に穴をあけるコウモリガの幼虫は、地表の草や枯葉から移動してくるので、根元周辺を除草し、幹下に木屑を見つけ次第駆除する。