



# サザンカ [山茶花]

5本の樹

常緑 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** ツバキ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや遅い

白の一重咲きが原種だが八重、赤、ピンク、白地にピンクの絞り咲きなど園芸品種が豊富。花期は、品種により秋から春まで幅がある。寒い地方では赤い花の夕チカンツバキがサザンカとして流通する。秋から冬、花の少ない時期に美しい花を咲かせる常緑樹として貴重な存在。



## Memo

茶畑に同じツバキ科のサザンカを植えると、香りの良いお茶ができるという。真偽は定かではない。

| お手入れカレンダー | 月 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 花         | 期 | (品種により異なる) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 果         | 実 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 紅         | 葉 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 施         | 肥 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 剪         | 定 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

| 好みの環境 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 日当たり  | 陽 | ○ | ○ |
| 土壌    | 乾 |   | ○ |
| 寒さ    | 強 | ○ |   |
| 暑さ    | 強 | ○ |   |
| 潮風    | 強 | ○ |   |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
|        | ○ | ○ |   |    |    |   |   |

**ポイント** 比較的浅根性（根の張り方が浅い）のため、根元が乾燥すると衰弱するのでマルチング材などで覆うと良い。早咲き品種は10月頃から、遅咲きは3月頃に開花する。

**剪定** 萌芽力があり剪定に耐えるので、生垣、添景、刈り込みなど利用範囲は広い。夏には翌年の花芽が形成されるので、剪定は梅雨前がよい。風通しの確保がポイント。

**病虫害** チャドクガが発生するため敬遠されやすいが、発生初期の幼虫は日中、葉の裏側に隊列を組んでいるので、比較的簡単に除去できる。他にはカイガラムシ。病害ではもち病になることがある。

呼べる鳥  [メジロ](#)・[キジバト](#)