



シロダモ

5本の樹

常緑 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 クスノキ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや遅い、雌雄異株

新葉時は独特の表情になる。新葉が白～黄褐色の細かいビロード状の毛に覆われ垂れ下がるため、この時期とてもよく目立つ。樹名も葉の裏面が白い粉で覆われることに由来する。雌雄異株で秋に開花するため、雌株では前年の赤い実と淡黄色の花を同時に見ることができる。



若葉



花



葉裏



雌花と実

Memo

クスノキ科の仲間のほとんどが春に開花するなか、シロダモは秋に開花する。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期											■	■	
果 実											■	■	
紅 葉													
施 肥		■ (痩せ地でなければ不要)											
剪 定		■					■						■

好みの環境				
日当り	陽	○	○	耐 陰
土 壤	乾	○	○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
							○

ポイント


多少の日陰地でも生育する常緑樹。目隠しやアイストップなど実用的な利用が多い。落葉樹に添わせると冬場の景のバランスが取れる。強健だが、移植は難しい。

剪定

クスノキほど大木にならないので、庭木に利用しやすい。成木になると生長が速くなるので、スペースに合わせて早目に剪定する。

病虫害

葉に虫こぶができることがある。シロダモハコブフシと言ひ、シロダモタマバエという昆虫の幼虫が寄生し'虫えい'が形成されたもの。葉ごと除去する。

呼べる鳥  シロハラ・ツグミ・クロツグミ

呼べる蝶  [アオスジアゲハ](#)