




シロヤシオ (ゴヨウツツジ) [五葉躑躅]

5本の樹

落葉／低木／木本植物／在来種



科名 ツツジ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや遅い

4～6月に咲く純白の花は、新緑と相まってとても美しい。枝先に5枚の葉を輪生状につけることからゴヨウツツジ。別名シロヤシオとも呼ばれる。新緑時の葉先は赤く縁取られ、秋には美しく紅葉する。ブナ帯など涼しい山地に自生するため、平野部の暖地では衰退しやすい。



葉



花



花拡大



紅葉

Memo

清楚な白い花を咲かせるシロヤシオは、2001年ご生誕の愛子様のお印となり、一躍脚光を浴びた。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実		(花後にできる 蒴果 (さくか) は花殻とともに除去する)											
紅 葉												■	
施 肥		■							■				
剪 定							■ (花後早めに) ★★						
★: 花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)													

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強		○	弱
潮 風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○	○	○	○			

ポイント

自然樹形を活かし野趣を味わいたいツツジ。強い日差しや西日、高温、乾燥などを避けて、風通しのよい酸性土壌の配植がよい。実生から育てられた苗木が流通するため開花まで4～5年かかる。

剪定

枝先に花をつけることもあり、剪定は最小限にとどめ自然樹形を楽しみたい。背丈以上に育つと花付もよくなる。邪魔な枝は枝先を剪定するのではなく、根元から切り詰めると樹形を損なわない。

病虫害

夏の高温時に乾燥すると、グンバイムシやハダニが発生し、葉が白っぽく変色しやすい。駆除し充分灌水する。新芽や蕾を食害するベニモンアオリンガが発生することがある。

呼べる蝶 コツバメ・ヒメシジミ・クロシジミ



COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.