




# ソメイヨシノ [ 染井吉野 ]

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 園芸品種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

「染井吉野」は桜の代名詞的な存在で各地に名所がある。ところが、明治以前のお花見は「山桜」。江戸後期にソメイヨシノが登場すると①葉の展開前に開花②花付きがよい③生長が速いなどの特性から広まった。接ぎ木で増やされるため遺伝子はすべて同じ（単一クローン）。



## Memo

クローンのため、同じ環境下であれば一斉に咲き、一斉に散る。開花予想はその特性を利用している。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実	※ソメイヨシノ同種間では結実しない												
紅葉・黄葉											■	■	
施 肥		■							■				
剪 定		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）													

好みの環境				
日 当 り	陽	○	○	陰
土 壌	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○		○	○		

**ポイント** 日当たりと排水のよい場所に高植が適している。浅根性（根の張り方が浅い）のため、踏圧(とうあつ)害を受けないように広い場所に配植するとよい。好条件下では枝が地表につくほど繁茂する。

**剪 定** 横枝を広げるように伸ばしてくる。将来不要になる枝は細いうちに剪定し、切り口を消毒し傷口癒合剤を塗布して感染を防ぐとよい。太くなってからの伐採は菌類などの病害に感染しやすくなる。

**病虫害** 病虫害が多いため、定期的にチェックし対処する。なかでも、天狗巣病が発生しやすい。公園などの古木では、コフキサルノコシカケなどの菌類が侵入し、腐朽するケースが増えている。