



# シャリンバイ [車輪梅]

5本の樹


常緑 / 低木 / 木本植物 / 在来種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや遅い

葉が枝先に車輪状につき、花がウメに似ていることからシャリンバイと呼ばれる。関東地方以西の太平洋沿岸に自生するため、潮風に強く、乾燥、暑さにも強い。常緑低木だが、一部の葉が紅葉する。ピンクの花が咲く園芸品種や葉の小さいヒメシャリンバイも流通している。



## Memo

大島紬の染色に使われる。シャリンバイのタンニン酸と泥田の鉄分が化合し特有の黒に仕上がる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実											■		
紅 葉					(常緑樹だが、古くなった葉の一部が紅葉する)								
施 肥		■							■				
剪 定		■						■	(花後早めに)				■
★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）													

好みの環境		陽	○	○	○	陰
日 当 り	陽	○	○	○		陰
土 壌	乾	○	○			湿
寒 さ	強	○				弱
暑 さ	強	◎				弱
潮 風	強	◎				弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					○

## ポイント


花つきが良く実もつけるが、実をつけ過ぎると樹勢が衰えるので、咲き終わったら花殻をつまんで取り除くとよい。剪定もこの時期一緒にする。

## 剪定

刈り込まなくても樹形がまとまるため、徒長枝を切り戻す程度でよい。刈り込む場合は5月、7月、11月の年3回すると良い。萌芽力はさほど強くないため強剪定は避ける。

## 病虫害

風通しが悪いとカイガラムシが発生しやすい。葉に斑点ができる「ごま色斑点病」はカビの一種の寄生が原因。雨滴の飛沫とともに伝染する。罹患した枝葉、落葉を処分する。

呼べる鳥  [キジバト](#)・[アカハラ](#)・[オナガ](#)

呼べる蝶  ヤクシマルリシジミ