



# ワイルドストロベリー

(エゾヘビイチゴ) [ 蝦夷蛇莓 ]

常緑 / 多年草 / 地被類等 / 草本植物  
/ 外来種・園芸品種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

3つの小葉、白い花、小さな赤い実など可憐な姿に人気がある。秋には一部の葉が紅葉する。ハーブ、グラウンドカバー、寄せ植えなど利用範囲が広い。明治期に渡来し、北海道で野生化したためエゾヘビイチゴの和名がある。ほかにも野イチゴ、プチベリーなどの愛称がある。



葉と花



花



黄葉の品種



実

## Memo

実はほのかに甘く香り、幸せを呼ぶ苺といわれる。ウエッジウッドの磁器の絵柄としても知られる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期				■						■		
果	実					■					■		
紅	葉	■											■
施	肥	不要 (葉が大きくなりすぎる)											
剪	定	(古い葉と熟した実の除去)											

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					○

### ポイント

日当たりと水はけがよければ、やせ地や寒冷地でもランナーを伸ばし繁殖する。日陰では咲かないが、グラウンドカバーとして利用できる。春によく咲き、涼しくなった秋にもちらほらと花をつける。

### 剪 定

枯葉や実は放置するとカビが生え病気の原因になるので早めに除去し、入り込む雑草を除草する。混み合う株は大きな葉など切り戻し新葉を再生させるとよい。肥料は不要 (葉が大きくなりすぎる)。

### 病虫害

実が熟すとナメクジ、昆虫類、野鳥などの食害を受けやすい。病害は灰色かび病、うどんこ病 (通風、水はけをよくして防ぐ)。虫害はアブラムシ、乾燥するとハダニの害を受けやすくなる。