



ヤブニッケイ [藪肉桂]

5本の樹

常緑 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 クスノキ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

常緑高木ではあるが、クスノキほど大きくならない。雌雄異株で、6月に開花し秋に黒く熟す。種子から香油が採れ、葉を揉むと芳香がする。根皮にも香気があるがニッケイより劣るため「ヤブ」がついた。福島県以南に分布し、乾燥に強く海岸近くの森林でよく見かける。



Memo

シロダモに似ているが、シロダモの葉裏はより白く、葉脈が葉裏から突出している点で見分ける。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期						■						
果	実										■		
紅	葉												
施	肥	■ (痩せ地でなければ不要)											
剪	定	■					■						■

好みの環境			
日当り	陽	○	○
土壌	乾	○	○
寒さ	強	○	
暑さ	強	○	
潮風	強	○	

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○						○

ポイント

葉は疑似対生で、微妙にずれがある。葉の形にも変異が多いが密生し、乾燥に強く丈夫なことから、目隠しや防風など実用目的で植栽されることが多い。移植を嫌うので配植場所に注意する。

剪定

強い剪定を嫌うが、生長が速く、樹形がまとまりにくいので枝が細い内に樹形を整えるとよい。目隠しや防風などの目的に合わせて剪定する。

病虫害

ニッケイトガリキジラミ、ニッケイハマクイボフシが葉に虫えい（ゴール）をつくることがある。

呼べる鳥  ヤマドリ・[ムクドリ](#)

呼べる蝶  [アオスジアゲハ](#)・ミカドアゲハ