



# ユリ類 [百合]

5本の樹

夏緑 / 多年草 / 地被類等 / 草本植物 / 在来種



科名 ユリ科 (APGⅢ)

特記 生長：普通

咲き方や花色に多彩な品種があり、系統により特性が異なる。①ヤマユリやカノコユリの改良品種オリエンタル・ハイブリッド②スカシユリやオニユリの改良品種アジアティック・ハイブリッド③テッポウユリの改良品種ロンギフロルム・ハイブリッドの3系統に分けられる。



ヤマユリ



カノコユリ



オニユリ



スカシユリ

## Memo

日本の山野には多種多様なユリが自生する。初めて見た欧米人は、園芸品種のような花に驚嘆した。

|           |    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------|----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| お手入れカレンダー | 月  | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|           | 花期 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|           | 果実 | (花後、花だけを摘み取り葉は残す) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|           | 紅葉 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|           | 施肥 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 剪定        |    |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

| 好みの環境 |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 日当たり  | 陽 | ○ | ○ | 陰 |
| 土壌    | 乾 | ○ | ○ | 湿 |
| 寒さ    | 強 | ○ |   | 弱 |
| 暑さ    | 強 |   | ○ | 弱 |
| 潮風    | 強 | ○ |   | 弱 |

|        |    |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|
| 観賞ポイント | 姿  |  |  |  |  |  |  |
|        | 花  |  |  |  |  |  |  |
|        | 葉  |  |  |  |  |  |  |
|        | 紅葉 |  |  |  |  |  |  |
|        | 黄葉 |  |  |  |  |  |  |
| 実      |    |  |  |  |  |  |  |
| 香      |    |  |  |  |  |  |  |

### ポイント

一般に①の系統の葉の広いユリは明るい半日陰を好み、②③の系統の葉の細いユリは日当りを好む。①は土壌の温度が上がらないようマルチング材などで覆うとよい。①②は寒さに強く③はやや弱い。

### 剪定

咲き終わったら花だけを摘むことがポイント。葉を残すことで球根が充実し、翌年たくさん花をつける。切り花にするときは、できる限り葉を残すとよい。秋に葉が枯れてきたら、地際から切り取る。

### 病虫害

ウィルスに感染すると、葉がモザイク模様になる。アブラムシが媒介することもあるので早めに駆除する。周囲の土壌の乾燥を防ぎ、剪定バサミから感染しないよう消毒するとよい。

呼べる蝶



[ルリタテハ](#)・[クロアゲハ](#)・[カラスアゲハ](#)

[ナミアゲハ](#)