



# ズミ (コリンゴ) [酸実]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通

林縁や湿地に自生する野生のリンゴ。9月頃色付く赤い果実がカイドウやリンゴに似るため、コリンゴとも呼ばれる。野生種は丈夫で病害に強いので、リンゴやカイドウの台木として利用されることが多い。1つの樹に形の異なる葉が付くのも特徴。野趣が楽しめる庭木の一つ。



緑葉



花



花



実

## Memo

ズミの新葉は2つ折り、葉は3～5裂することが多い。樹皮の抽出液は黄色の染料に使われる。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
| 花 期       |   |   |   |   |   | ■ |   |    |   |   |    |    |    |
| 果 実       |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | ■  |    |    |
| 紅 葉       |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
| 施 肥       |   | ■ |   |   |   |   |   |    | ■ |   |    |    |    |
| 剪 定       |   | ■ |   |   |   |   |   | ★★ |   |   |    |    | ■  |

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

| 好みの環境 |   |   |   |     |
|-------|---|---|---|-----|
| 日 当 り | 陽 | ◎ | ○ | 陰   |
| 土 壌   | 乾 |   | ○ | ○ 湿 |
| 寒 さ   | 強 | ◎ |   | 弱   |
| 暑 さ   | 強 |   | ○ | 弱   |
| 潮 風   | 強 |   | ○ | 弱   |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
|        |   |   | ○ |    |    |   | ○ |

## ポイント

自生地は日当りのよい林縁や湿原。庭木として育てる場合も、日当たりがよく湿り気ある土壌でよく生育する。特性を生かした配植にするとよい。

## 剪定

ハナカイドウ同様に、剪定して短枝を増やすと良く花をつける。その際、切り口を消毒し癒合剤を塗り、菌類や細菌の感染を防ぐことが大切。

## 病虫害

一般的なカイガラムシ、アブラムシのほか、うどんこ病やテッポウムシ（カミキリムシの幼虫が幹に穴をあける）の被害を受けることがある。

## 呼べる鳥



アオバト・ホオジロ・[イカル](#)  
アオジ・[メジロ](#)・[アトリ](#)・[キジバト](#)  
ウソ・[ツグミ](#)

## 呼べる蝶



カラスシジミ・ムモンアカシジミ  
エゾシロチョウ